



ENGOULEVENT PIRAMIDIG

Chordeiles gundlachii



Ordre : Caprimulgiformes

Famille : Caprimulgidae

Observation en
Guadeloupe

J F M A M J J A S O N D

STATUT DE L'ESPECE EN GUADELOUPE

Nicheur migrateur

EN (En Danger)

SANS STATUT (donc non chassable)

PEU COMMUNE

REPARTITION DE L'ESPECE EN GUADELOUPE



carte issue de www.ebird.org

AMAZONA



Description

L'Engoulevent piramidig est

un oiseau nocturne que l'on peut observer au crépuscule et à l'aube, ou à n'importe quel moment par temps couvert.

D'une envergure d'environ 50 cm, il pèse 50 g. Il a de longues ailes pointues et une queue échancrée. Son plumage cryptique, consiste en des marques brunes, noires, grises et chamois, également caractérisées chez le mâle par une petite bande blanche sur les primaires, une tache blanche sur la gorge et une bande subterminale blanche sur les plumes de la queue sauf sur les plumes centrales. La femelle est semblable mais présente des taches chamoisées sur la gorge et la coloration générale du plumage plus chaude, avec une tache alaire moins étendue et la bande de queue blanche absente. Le juvénile est similaire à la femelle mais la tache sur la gorge est absente. Les ailes sont maintenues en V en vol plané. Le vol est flottant, rapide et erratique, entrecoupé de glissades.



Sons

Son cri ressemble à celui d'un insecte. En vol, le mâle émet plusieurs syllabes (2 à 7), qui lui valent plusieurs surnoms locaux, tels que « querequeté » à Cuba ou « querebébé » en République dominicaine.

Parfois, il émet un autre son, appelé « boom », en remontant après une plongée raide. Ce son semble émis par l'effet de l'air sur les rémiges primaires (plumes externes des ailes).

Habitat

L'Engoulevent piramidig fréquente les zones ouvertes ou semi-ouvertes arides (savanes ouvertes, champs de cannes, pâturages, etc.). On peut également l'observer dans des zones urbaines où il profite probablement des insectes attirés par les lumières artificielles (en Guadeloupe, on peut l'entendre et même le voir dans toute la zone autour de l'aéroport international par exemple).

Alimentation

Insectivore, il se nourrit en vol de divers insectes qu'il poursuit grâce à son vol agile et erratique, au-dessus des forêts, des champs, ou des zones urbanisées (centres commerciaux, etc.) Il peut chasser seul ou en groupe, parfois jusqu'à 50 individus ensemble (à Cuba par exemple).



Reproduction

Les nids sont dans des zones ouvertes avec un sol nu : zones rocheuses et herbeuses ouvertes, plages, toits plats, carrières, etc. La femelle pond un à deux oeufs directement sur le sol ; de couleur cryptique, ils se fondent sur le gravier ou le sable. Il y a peu d'informations sur le reste de la reproduction. Nidifuges, à l'éclosion les poussins sont couverts d'un duvet homochrome, leur permettant de passer inaperçus dans leur environnement.

Selon nos observations, l'espèce semble fidèle à son site de reproduction, à quelques mètres près !

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport suivant, téléchargeable sur le site d'AMAZONA :

LEVESQUE A. 2020. Suivi de l'Engoulevent piramidig *Chordeiles gundlachii* en Guadeloupe, dans le cadre de l'amélioration de la connaissance de son statut. Rapport Levesque Birding Enterprise / Rapport AMAZONA n°69. 26 p + annexes.

Le saviez-vous ?

Le mot engoulevent vient de engouler (avalier brusquement) et vent.

Si vous pensiez que les engoulevents avaient un bec minuscule, détrompez-vous : en vol il ouvre son bec qui est très large, ce qui lui permet d'engloutir ses proies.



Photo : Anthony Levesque